



Пакленац

Lycaena helle (Denis & Schiffermüller 1775)

Пакленац је мали лептир кога краси неколико нијанси плаве и љубичасте које се пресијавају са горње стране крила, што је посебно изражено код мужјака.

Лептир је први пут пронађен на Старој планини тек 2011. године где се и данас једино може видети на Балканском полуострву²¹. Пошто представља остатак бореалне прошлости, у Европи га срећемо само на северу и на високим планинама унутар континента. Насељава влажну, мочварну вегетацију која се развија дуж планинских потока од Понора, преко Стражне чуке до Копрена и вероватно даље на североисток до оближњих популација у Бугарској. Једина генерација се јавља у кратком распону од краја маја до друге половине јуна.

Распрострањење: Палеарктик. У Европи веома локалан.

Биљке хранитељке: *Polygonum bistorta*.

Висински распон: 1300-1800 m

Угроженост: У Европи угрожен (EN), у Србији угрожен (EN)²¹.

Статус: Врста наведена у Прилозима II и IV Директиве о стаништима ЕУ.

Violet copper

Lycaena helle (Denis & Schiffermüller 1775)

Violet copper is a small butterfly adored by several shades of blue and purple that shine on its upperside, especially pronounced in males.

The butterfly was for the first time found in Stara Planina only in 2011, and it is still the only place it can be seen in Balkan Peninsula²¹. Since it is relict from boreal past, in Europe it is found only in the north and on high mountains of the continent. It inhabits moist, bog vegetation that develops along mountain streams from Ponor, via Stražna Čuka to Kopren, and probable further to northeast, connecting with populations in nearby Bulgaria. The single brood is active in short span from end of May to second half of June.

Distribution: Palearctic. In Europe very local.

Larval host plants: *Polygonum bistorta*.

Altitudinal range: 1300-1800 m

Threat: In Europe Endangered (EN), in Serbia Endangered (EN)²¹.

Status: Species listed in Annexes II and IV of EU Habitats Directive.