



Hesperiidae

Риђи скелар

Ochlodes sylvanus (Esper 1777)

Риђи скелар је један од најкрупнијих представника своје породице. Током мировања често држи крила у полуотвореном положају. Непогрешиво се може разликовати од сродника по антенама које се увек завршавају кукицама.

Као и већина других лептири чије се гусенице хране травама, риђи скелар се налази свуда и сматра се уобичајеном врстом у Србији. Ипак, нешто чешће га виђамо у близини шума и крај шумских путева. Годишње се јавља у највише три генерације, од краја априла па све до октобра.

Распрострањење: Палеарктик.

Биљке хранитељке: Роасае.

Висински распон: 0-1800 m

Угроженост: Није угрожен.

Статус: Није заштићен.

Large skipper

Ochlodes sylvanus (Esper 1777)

Large skipper is one of biggest members of its family. When not flying, it often keeps wings partly spread. It is unmistakable due to its antennae that always end in small hooks.

As majority of other butterflies whose caterpillars are feeding on grasses, large skipper is found everywhere and is considered common species in Serbia. There are up to three broods annually, from the end of April until October.

Distribution: Palearctic.

Larval host plants: Poaceae.

Altitudinal range: 0-1800 m

Threat: Not threatened.

Status: Not protected.

Тачкасти скелар

Hesperia comma (Linnaeus 1758)

По изгледу и величини тачкасти скелар је сличан риђем скелару, али га додатно красе изражене беле тачке на крилима.

Тачкасти скелар насељава читаву Србију, при чему бира нешто сувља, отворенија и топлија станишта од риђег скелара. И време појаве лептира се знатно разликује, пошто се одрасли јављају од јула до септембра у једној генерацији. Женке након парења полажу јаја на биљку хранитељку или суседне биљке, обично близу тла.

Распрострањење: Палеарктик.

Биљке хранитељке: *Festuca ovina* и друге траве.

Висински распон: 0-1700 m

Угроженост: Није угрожен.

Статус: Није заштићен.

Silver-spotted skipper

Hesperia comma (Linnaeus 1758)

By its appearance and size, silver-spotted skipper is similar to large skipper, but is also adorned with white spots on its wings.

Silver-spotted skipper populates all of Serbia, choosing somewhat drier, more open and warmer habitats than large skipper. They appear at different times, adults of this species fly from July to September in a single brood. After mating, females lay eggs on larval foodplant or nearby plants, usually close to the ground.

Distribution: Palearctic.

Larval host plants: *Festuca ovina* and other grasses.

Altitudinal range: 0-1700 m

Threat: Not threatened.

Status: Not protected.