



***Parasemia plantaginis* (Linnaeus, 1758)**

Лети од маја до јула а становник је високих предела, чак и изнад 2000 м. Распон крила му је 35-40 mm. Забележен код Миџора, Топлог Дола и Равног Бучја.

It flies from May to July and inhabits high grounds, even above 2000 m. Its wingspan is 35-40 mm. Recorded at Midžor, Topli Do and Ravno Bučje.

***Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758)**

Честа врста која лети у две генерације од априла до септембра, али се може видети и у марта. Распон крила је 32-36 mm. Углавном налажена у јужном делу подручја.

Common species that flies in two broods from April to September, but can also be seen in March. Its wingspan is 32-36 mm. Mostly found in southern part of the area.



***Watsonarctia deserta* (Bartel, 1902)**

Ова ретка врста има распон крила од 26 до 32 mm. Лети од априла до краја јуна. Једини налаз је из Равног Бучја.

This rare species has a wingspan from 26 to 32 mm. It flies from April to the end of June. Single record is from Ravno Bučje.



***Chelis maculosa* (Gerning, 1780)**

Лети од јуна па до почетка септембра, а на Старој планини је нађен само у околини Зајечара, код Грлишке реке у јулу. Распон крила му је 32-34 mm.

It flies from June to the beginning of September, and in Stara planina was found only in vicinity of Zaječar, at Grliška Reka in July. Its wingspan is 32-34 mm.

***Coscinia striata* (Linnaeus, 1758)**

Црне линије на предњим крилима које су изражене код мужјака, код женке су одсутне. Распон крила је 30-40 mm, а овај лептир је активан од маја до првих дана септембра.

Pronounced black lines at male's forewings are absent in females. Wingspan is 30-40 mm, and this moth is active from May to first days of September.



***Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)**

Одрасли лептири лете од краја јуна па до средине септембра. Иако прилично честа у Србији значајна је јер спада у Натура 2000 врсте. Распон крила јој је 52-62 mm.

Adults fly from end of June to the middle of September. Although quite common in Serbia it is important because is one of Natura 2000 species. Wingspan is 52-62 mm.



***Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758)**

Распон крила је 32-43 mm, а лети од маја до јула. Гусенице могу бити канабалистичке чак и кад има довољно хране. Иако редак лептир у Србији, нађен је на више локација у источном делу подручја.

Its wingspan is 32-43 mm, and it flies from May to July. Caterpillars can be cannibalistic even when there is enough food. Although rare moth in Serbia, it was found at several locations in eastern part of the area.



***Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758)**

Лети у току дана од јуна до августа. Распон крила му је 48-54 mm. Бројност овог лептира је у опадању због уништавања станишта, наложен је уз источни руб подручја.

If flies during the day from June to August. Its wingspan is 48-54 mm. Populations of this moth are decreasing due to habitat destruction, found only along eastern border of the area.