

Red malih insekata među kojima najkrupnija svetska vrsta dostiže 50 mm. Prepoznaju se po duguljastom i spljoštenom telu, a naročito po kleštima na zadnjem kraju. Ta klešta (tačnije cerci) su karakteristično zakrivljena kod mužjaka, a prava kod ženki. Iako zbog njih insekt izgleda opasno, njihov stisak uopšte nije bolan. Naučni naziv reda (Dermaptera) bi u prevodu glasio "Kožokrilci".

U mnogim jezicima je naziv izveden od reči uho, najčešće zato što su široko raširene bapske priče da se ovi insekti ljudima zavlače u uvo i zatim se probijaju do mozga da bi tu položili jaja. Priča je, naravno, izmišljotina mada je istina da se veoma retko zaista desi da se uholaza uvuče nekome u uho.

Pojedine vrste uopšte ne lete, a i ostale radije



Obična uholaza, mužjak

hodaju i tek se retko odlučuju za letenje.

Kod uholaza se sreće jedna pojava zaista veoma retka u svetu insekata - briga o porodu. Uholaze su brižne majke, paze na jaja i kasnije na larve. A kod mužjaka nekih vrsta se sreće jedna druga zanimljivost - oni imaju dva potpuno funkcionalna penisa.

Photo by Tom Oates, 2010



Ženka sa jajima i larvama

Obična uholaza (*Forficula auricularia*) je najčešća vrsta među uholazama. Dan obično provodi skrivena u nekom udubljenju, hrani se pretežno noću. Pogoduju joj hladna i vlažna staništa.

Izmirska uholaza (*Forficula smyrnensis*) je nešto ređa i veća od obične uholaze. Prisutna je u jugoistočnom delu Evrope. Glava i pronotum su svetliji od pokrivalaca, a izraženije su četiri svetle mrlje.



Izmirska uholaza